

PROTOCOLLO

Iniezione isteroscopica vs. cervicale di tracciante per identificazione del linfonodo sentinella nel tumore dell'endometrio: studio randomizzato, multicentrico

P I Dr Antonino Ditto, M.D.

Pazienti con ca endometrio early, stadio FIGO I-II
Work-up and Lps : assenza di diffusione peritoneale e/o
linfonodi bulky
RANDOMIZZAZIONE 1-1

Inoculo cervicale

N= 80

Identificazione ed
asportazione linfonodi
sentinella pelvici e/o
para-aortici
Ultrastaging

Inoculo
endometriale

N=80

Identificazione ed
asportazione linfonodi
sentinella pelvici e/o
para-aortici
Ultrastaging

La linfoadenectomia sistematica è lasciata alla
discrezione del chirurgo

Centri che hanno dato la loro disponibilità a partecipare allo studio:

- INT Milano; PI. Dr Ditto; Dr. Raspagliesi; Dr Martinelli; Dr Bogani;
- H San Orsola - Bologna Dr De Iaco; Dr Perrone
- Ospedale dell'Insubria Varese; Prof Ghezzi
- Istituto Tumori Regina Elena Roma, Dr Vizza e Dr Savarese
- Ospedale Careggi Firenze; Dr Dr. Cariti; Dr Serena Tarani.

Stato Avanzamento lavori

- Protocollo attivato presso INT
Milano; PI. Dr Ditto;
- Arruolati 9 pazienti
- Protocollo in corso di attivazione
presso gli altri centri